

گلا گھونٹنے کے بعد کی دیکھ بھال کی ہدایات

اونٹاریو نیٹ ورک آف ایس اے / ڈی وی ٹی سی (Ontario Network of SA/DVTC)

آج آپ پر کسی حملہ ، جس میں "دم گھٹنا" یا گلا گھونٹنا شامل ہے ، ہونے کے بعد والی دیکھ بھال کے لئے معائنہ کیا گیا تھا ۔ یہ ہدایات آپ کو یہ جاننے میں مدد دیں گی ، کہ ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں کب جانا ضروری ہے۔

ہم آپ کو گھر واپس آنے کے لئے ہدایات فراہم کر رہے ہیں۔

گلا گھونٹنا کیا ہے؟

گلا گھونٹنا گردن اور دماغ کو چوٹ پہنچا سکتا ہے۔ جب کسی کا گلا دبا یا جاتا ہے تو ، یہ دماغ میں خون کے بہاؤ کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس سے دماغ اور زیادہ داشت کی صحت کے ساتھ ساتھ ، جسمانی اور دماغی صحت کے دیگر خدشات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔

گھر کیلئے ہدایات:

اس وقت آپ کی علامات ہلکی ہیں ، لہذا آپ کو گھر جانے کے لئے ہسپتال سے خارج کیا جا رہا ہے۔ یہ تجویز کی جاتی ہے کہ گلا گھونٹنے کے اس تجربے کے بعد اگلے 24-72 گھنٹوں تک ایسا کوئی شخص جس پر آپ کو بھروسہ ہو ، وہ آپ کے ساتھ رہے۔

آپ کو کچھ خراشیں یا بے آرامی محسوس ہو سکتی ہے۔ پہلے دو دن کے دوران ہر دو سے تین گھنٹے میں 15-20 منٹ تک برف لگائیں۔ اس سے خراشوں کی دکھن اور درد کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

یہ ممکن ہے کہ اگلے دو گھنٹوں میں یا کچھ ہی دنوں میں آپ کی علامات خراب تر ہو جائیں۔ برائے کرم 911 پر فون کریں یا اگر آپ کو یا آپ کے تعاون کرنے والے شخص کو مندرجہ ذیل میں سے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے تو ، فوری طور پر قریب ترین ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں جائیں :

- سانس لینے میں زیادہ دشواری آتی ہے (جب لیٹے ہوں تو سانس لینے میں دشواری ، ساکن بیٹھتے وقت سانس میں تنگی ، نئی مستقل کھانسی ، یا کھانسی کے ساتھ خون آنا)
- شعور کا کھو جانا یا "بے ہوش ہو جانا"
- آواز میں خراب تر تبدیلیاں آنا یا بولنے سے قاصر ہونا
- نکلنے میں مزید دشواری یا رال ٹپکنا
- مستقل یا خراب تر ہوتی ہوئی حلق ، گردن یا زبان کی سوجن مستقل گردن کے درد میں اضافہ جو بغیر نسخہ کی کاؤنٹر پر سے سراسر خریدی ہوئی دوائوں سے بہتر نہیں ہو رہا ہو
- جسم کے دونوں طرف میں سے کسی ایک طرف کمزوری ، بے حسی ، یا جھنجھناہٹ ہونا
- چلنے کی صلاحیت میں کوئی تبدیلی آنا
- نیا یا بگڑتا ہوا سر درد
- نیا چکر آنا یا ہلکا سا سر چکرانا
- بینائی کم ہو جانا یا مستقل بینائی میں دھندلا پن آنا
- آپ کے چہرے پر ، آپ کے منہ کے اندر یا آنکھ میں سرخ یا جامنی رنگ (پیٹیجیا) کے نشان

Strangulation Discharge Instructions – Urdu Translation

- دورے پڑنا
- آگاہی کی سطح میں اچانک تبدیلیاں جیسے، الجھن، جنون کی حد تک شک کرنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے نئے یا بدتر خیالات، یا ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ/غنودگی
- مضمحل پلک یا پلکیں
- پیشاب یا پاخانے پر قابو نہ رہنا

اگر آپ حاملہ ہیں تو، دم گھٹنا اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی علامات میں ظاہر ہوں تو، فوری طور پر اپنی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے (جیسے: دائی، معالج، نرس پریکٹیشنر) کو رپورٹ کریں:

- حمل کے دوران جنین کی حرکت میں کمی
 - اندام نہانی سے ہلکے خون کے نشان نماں ہونا یا اس سے خون بہنا
 - پیٹ میں درد
 - اعضامیں اینٹھن/اکڑن کا احساس ہونا
- جنسی استحصال / گھریلو تشدد مرکز (سیکسول اسالٹ/ڈومیسٹا وائینز ٹریٹمنٹ سینٹر) میں آپ کو فراہم کی گئی دیکھ بھال کے بارے میں اگر آپکے کوئی سوالات ہیں تو، براہ کرم ہم سے رابطہ کریں۔

آپ _____ پر ہمیں کال کر سکتے ہیں

(ایس اے/ڈی و ی ٹی سی کا فون نمبر)

ہمارا پتہ ہے:

اسپتال کا نام، پتہ